

Cuestionario sobre síntomas urinarios en relación con el vaciamiento de la vejiga neurogénica (Urinary Symptom Questionnaire for Neurogenic Bladder-Void, USQNB-V)

ACCIONABLES

- Espasmos en la vejiga frecuencia/malestar
- Mayor dificultad para deambular (caminar)
- Aumento del tono/espasticidad (no espasmos de la vejiga)
- Sudoración

- Sensación de febrícula/sensación de fiebre
- Dificultad para pensar, obnubilación, mala memoria o presencia de olvidos
- Disreflexia autonómica (AD, por sus siglas en inglés)
****SÓLO en lesión de la médula espinal**
- Exacerbación de la esclerosis múltiple (recidiva, ataque)
****SÓLO esclerosis múltiple**

_____ **Total de síntomas “Accionables”**

VEJIGA

- Sangre en la orina
- Aumento de la frecuencia urinaria
- Urgencia urinaria
- Incontinencia/fugas de orina o accidentes urinarios
- Sensación de urgencia/de vaciar la vejiga
- Disminución del volumen de orina
- Incapacidad para vaciar la vejiga por completo
- Chorro de orina débil

_____ **Total de síntomas de la “Vejiga”**

CALIDAD DE LA ORINA

- Orina con mal olor, pestilente o de olor fuerte
- Orina oscura
- Orina turbia/sedimento en la orina

_____ **Total de síntomas de la “Calidad de la orina”**

INESPECÍFICOS

- Malestar general, sentirse indispuesto
- Incremento de la fatiga, letargia o debilidad muscular
- Escalofríos
- Náuseas
- Vómitos

_____ **Total de síntomas “Inespecíficos”**

Categoría del síntoma	Total
Accionables	
Vejiga	
Calidad de la orina	
Inespecíficos	